


E 薬剤に関する指標

24. アスピリン使用率

■計算方法 入院の契機になった病名がAMI症例でアスピリンを使用した症例数 / 入院契機病名がAMI症例数

■DPCデータ分析システム「EVE」より算出




	AMI症例 アスピリン 使用率	アスピリン使用数	AMI症例数
2009年度	81.8%	18	22
2010年度	67.7%	21	31
2011年度	73.1%	19	26
2012年度	67.5%	27	40
2013年度	61.9%	26	42
2014年度	75.7%	28	37
2015年度	63.5%	33	52
2016年度	64.4%	29	45
2017年度	63.6%	42	66
2018年度	67.6%	48	71

定義) 急性心筋梗塞症例において、病院搬送時にアスピリンを使用した症例の割合

25. βブロッカー使用率

■計算方法 入院の契機になった病名がAMI症例でβブロッカーを使用した症例数 / 入院契機病名がAMI症例数

■DPCデータ分析システム「EVE」より算出



	AMI症例 βブロッカー 使用率	βブロッカー使用数	AMI症例数
2009年度	4.5%	1	22
2010年度	3.2%	1	31
2011年度	15.4%	4	26
2012年度	12.5%	5	40
2013年度	2.4%	1	42
2014年度	18.9%	7	37
2015年度	9.6%	5	52
2016年度	13.3%	6	45
2017年度	31.8%	21	66
2018年度	32.4%	23	71

定義) 急性心筋梗塞症例において病院搬送時にβブロッカーを使用した症例の割合